


Професоръ Дръ Юрій Брдликъ
Грудное дитятко.



„Выдано министерствомъ общественного здоровья
въ Празѣ при помощи Школьного отдѣла
въ Ужгородѣ.“


Приспособивъ для русскихъ матерей
К. В. КОХАННЫЙ.

Типографія „Политика“ Прага 1922.

EX
LIB
RIS



PAUL R. MAGOCSI



Професоръ докторъ медицины
ЮРІЙ БРДЛИКЪ:

ГРУДНОЕ ДИТЯТКО

Изданіемъ Министерства народнаго здоровья
и Школьнаго реферату въ Ужгородѣ




Приспособивъ для русскихъ матерей

К. В. КОХАННЫЙ

ПРАГА

Типографія „Политика“

1922



Digitized by the Internet Archive
in 2016

РУСКИМЪ МАТЕРЯМЪ

Ю. Б.





Здорова дитина есть счастье и ярь житія. Сесе **Введение.** со дѣтьми проживаютъ наново и родичи — отецъ и мати — дѣдо и бабка, и цѣлой округъ дитины. Во дитинѣ видиме свою минувость, свою молодѣсть, поровнюеме свое житіе со житіемъ еѣ, возлагаеме на ню надѣю на лѣпшу будущность и желаеме, абы еѣ будущность была лѣпша и пріятнѣша минувшого нашего житія. Отси выплывае желаніе, абы дитина была добре охранена якъ тѣлесно, такъ и душевно ото всего шкодливого; съ той причины глядаеме условія, обогащенья нашего воспитанія, выховы дитины.

Во здоровѣмъ тѣлѣ здоровый духъ; можъ бы сказати, что мало здоровыхъ дѣтей середъ тыхъ, у которыхъ душевна дѣятельность заложена непорядочно. Для того и тогда, коли еще дитина не проявляе душевныхъ способностей, треба старатися надъ здоровымъ розвоемъ якъ души еѣ, такъ и тѣла.

Дѣтствомъ называеме добу отъ урожденія ажъ до половой зрѣлости и дѣлиме сесю пору на три части: на добу кормленія молокомъ матери (грудное дитя), добу душевного пробужденія и добу науки во школѣ.

Сеся книга посвящается первой порѣ.

I.

Абы добре доношена дитина появилась на свѣтъ потребно 280 днѣвъ, або 40 тыжднѣвъ, ци 9 мѣсяцовъ отъ оплодотворенія материнского яечка, ажъ до породу.

**Доба ва-
гитности.**

**Якъ опре-
дѣлити
день
рожденія?**

Добу, когда дитина народится можеме высчитати а при томъ хоснуемеса днемъ, когда было послѣднее чищеніе крови будучой матери. Отсчитаеме отъ doby послѣднаго сего періода 3 мѣсяцѣ, прибавиме 7 днѣвъ и найдемe приближный день породу. Примѣръ: послѣдний день послѣднаго періода бывъ 15 мая. Отсчитаеме 3 мѣсяцѣ и ко 15 февруарію присчитаеме 7 днѣвъ. Такъ найдемe, что дитина мае народитися 22 февруара. Сесе число, розумѣется, есть не точное: можеме помилитися и на цѣлый тыждень, понеже часто бывае, что матка не скаже точно день послѣднаго чищенія крови (періода).

**Дитина
доношена.**

Коли дитина народится во правильну добу, то кажемe, что есть доношена. Дѣвчатка важуть примѣрно 3 килограма съ четвертью, а хлопцы три съ половиною килограма. Довжина тѣла новорожденного есть отъ 48 до 52 сантиметровъ, значить приближно половина метра. Обхватъ головки отъ чола до тылу есть 33—35 см., объемъ грудины 31—35 см. Значить объемъ головы и грудины у новорожденного почти однаковѣ. Шкура новорожденного червонава, подложена жиромъ. На нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно на плечахъ, видиме да где пушокъ. Червона фарба шкуры причинена тымъ, что дитина перемѣняе мѣсто своего быванія: тепло на холодъ. Во чревѣ матери находилося при теплотѣ 37 градусовъ, а послѣ рожденія переходитъ до теплоты жилищного воздуху 18—20 градусовъ. Сеса перемѣна причиняе росширеніе кровяныхъ цѣвочокъ и сильнѣйшее движеніе крови въ тѣлѣ. Помало тѣло привыкае до перемѣненной теплоты и шкура получае блѣднѣйшу фарбу.

Головка новорожденного покрыта волосочками ажъ до 2 см. довжины, ногти на рукахъ и ногахъ добре розвинутѣ и переростають концы пальчиковъ.

Дитина вызерае здорово и спитъ почти цѣлый день.

**Дитина не-
доношена.**

Недоношена дитина рождается передъ девятымъ мѣсяцемъ, въ каждомъ случаю по семомъ мѣсяцю вагитности. Сесѣ дѣти мають всѣ признаки недоконченнаго развитія: важуть звычайно меньше двохъ съ половиною килограмовъ, невелики (около 48 см.), ма-

ють меньшу тѣлесну теплоту и дуже чувствительнѣ ко холоду, слабеньки, слабо цыцають, або и не знають цыцати и спять цѣлый день.

Дитина, что народится передъ семымъ мѣсяцемъ беременности, не способна жити и умирае (выкидышъ).

Першимъ проявомъ новорожденного, когда увидить свѣтъ, есть порядочный крикъ. Его сильный голосъ намъ вѣщае, что добре дыхае. Когда не кричить, то треба его поплескати долонею по крыжахъ, и такого першого „битя“ доста, абы малому гражданинови пригадати его повинность.

Связку пуповинну перестриже лѣкаръ, або до-свѣдна, опытна повивальна бабка.

Потомъ возьмеме дитину одною рукою подъ головку и надъ плечиками, другою надъ сѣдалищною костью и положиме ю навznakъ на стѣлъ. Мае при-готовлену воду и ватою, въ нѣ намоченною, вытреме новорожденному очи, уста и носъ.

Первою дальшою нашою задачею есть сокотити очи новорожденного. И тамъ, где нѣтъ подозрѣня, что мати страдала заразительнымъ истечениемъ, най не бере новорожденного на руки, доки ихъ якъ слѣдуе не умые. Всягди съ початку дитину прогляньме и приведѣмъ ю до порядку а ажъ потомъ матку (абы не перенести на дитину случайно хоробъ, которыми стра-дае матка). Во кождѣмъ случаю добре до очей ново-рожденного капнути да колько капель 1% серебря-ного роствору. Начнеме такъ: лѣвою рукою отдалимe вѣчка одно отъ другого, указательнымъ пальцемъ го-рѣшное а великимъ пальцемъ долѣшное, а другою ру-кою накапаеме капальничкою да колько капель спо-мянутого роствору.

Бывае, что нѣсколько годинъ по рожденію дитя уже выпорожние свое черево. Сесь першій калъ мае темногнѣду фарбу, безъ запаху и похожъ на смолу. Сесе изъ того, что дитина поглощала плодovu воду, изъ соковъ кишокъ плоду, послѣдковъ выставьковыхъ частицъ черевовыхъ и частички жовчи. Обычно уже на другій день калъ мае иншаку фарбу: пожовтне, мае якъ кажутъ фарбу мѣшаныхъ яецъ, есть кашовитый, кисловатый и мае пріятный „теплый“ запахъ. За день

**Вы-
кидышъ.
Крикъ.**

**Пупцева
связка.**

Очи.

**Выпорож-
неніе
желудку.**

во першомъ тыждню дитина выпорожнѣе черевѣ, 2—6 разъ, слабше выпорожненіе есть 1—3 разъ денно.

- Потомъ новорожденного першій разъ выкупаеме.
- Купелька.** Найлѣпше буде, если дитина достане въ подарунокъ малу купелечку а въ той абы ничъ другого не пралось, анѣ не умывалось, лишь она. Жалко, что во многихъ удобныхъ семействахъ не могутъ родителѣ собѣ позволить такой „роскоши“ и хоснують таку купелечку и для праня шматя. Треба памятити, что праня шматя и пеленокъ, запаскуженныхъ каломъ, дуже нечиститъ купелю и шкодитъ дитинѣ. Шкура новорожденного и отворена пупкова рана дуже чувствительнѣ на кажды хоробу и нечистоту и треба купелечку, передъ купаніемъ дитины якъ слѣдуе выпарити кипящою водою.
- Купаніе.** До купелечки, прикрытой чистымъ простыряломъ, наливаеме 15—18 литровъ перевареноѣ воды. Варуймесь подлой старой привычки измѣрять теплоту воды голою ажъ до локтя рукою. Сесе не допускаеся, понеже чувство руки може легко насъ обманути, особенно у людей тѣлесно працюющихъ и можеме новорожденного попарити, або выкупати во дуже горячей водѣ, что може сильно пошкодити слабому тѣлесному организму дитины. Хоснуйме найлѣпше обычный тепломеръ и приготавлиаеме купелю 35 градѣвъ Цельсія, для недоношенныхъ дѣтей 37 градѣвъ.

Матка держитъ голову дитины подперто надъ водою лѣвою рукою, абы не вошла вода до роту и очей новорожденного. Правою рукою дитину обмывае. При першомъ купанію добре натрѣе тѣло дитины вазелиномъ и лишь потомъ намылиме и умываеме (наилѣпше ватою). Тѣло по рожденію покрыто плодовою матерією, которая добре смываетъ лишь при помощи вазелины. Въ купелѣ мать умываетъ дитинѣ руки, грудѣ, животикъ и ноги, потомъ дитину перевертають и умываютъ еѣ крыжѣ и сѣдалищное мѣсто, а особенно старательно вымываются всѣ загибки (подъ пахою, шейку, межъ ногами). По купелѣ, которая продолжается до 5 минутъ, дитя не вытираеме, але высушиме чистымъ простыряломъ, которе до тѣла притиснеме долонею. Такъ высушене тѣло посыпаеме, где треба дѣточимъ порошкомъ, пупкову ранку прикрѣеми чистымъ.

стымъ мягкимъ полотномъ, перевяжеме чистымъ мягкимъ кускомъ полотна и спеленаеме.

Одежа малой дитины складается изъ сорочки и кабату безъ гомбиковъ; сорочка и кабатъ, съ роз-

Одежа.

Обр. ч. 1.



Правильне положеніе дитины до купельки.

рѣзомъ на крыжахъ завязуются близко шеѣ полотнянымъ шнурочкомъ. Дитину одягаеме обычаино тымъ способомъ, что рукавы сорочки всунеме до рукавовъ кабату и потомъ обое разомъ одягнеме. Съ початку загорнеме дитину до трохсторонной пеленки, одинъ

рогъ которой прійде межъ ножки а други положатся до высоты краивъ сѣдалища (мѣста выкалу). Кутокъ пеленки межъ ногами обернеме въ напряду пупка а други два переложимъ съ боку одинъ черезъ другій. Сесю пеленку загортаеме пеленкою чотырохсторонною, котору часто замѣняютъ теплою фланелею (байкою). Богатѣйши уживають каучукъ, або Бильротовый батистъ. Въ томъ случаю треба, абы сеся непромокательна матерія не сходилася съ переду, але мала 2—3 пальцѣ до схождения, абы дитина не была непродушно до каучуку загорнена и абы вогкость могла выпарятися. Потомъ дитину загорнуть до перинки и перевяжутъ необходимымъ „повіякомъ“. Сесе „шнуроваadlo“ мусить хосноватися розумно, понеже многи наши матки вѣрятъ что дитина мае быти крѣпко закутана и „повіякъ“ сильно стягнутый, абы, кажутъ, ровно росла. Когда такъ спутана дитина розвяжется, то вызерае якъ египетска мумія. А прецѣнь ясно есть, что малое дитя потребуе протягнутися, гратися ножками, двигатися. Не стягайте дуже певно „повіяка“, лишайте ручки дитины свободными, розвяжьте часомъ ю и оставьте поковтатъ ножками и ручками. Памятайте, что особенно при лѣтной жарѣ и спрагѣ опасно дитину стяговати и крѣпко стяговати. Вогкость не може выпарюватися, тѣлесна теплота повысится и дитина може тяжко захорувати. Треба старатися, абы въ лѣтѣ мавъ воздухъ на тѣло дитины доступъ!

Ѣда.

Теперь мае новорожденне закутаное и першій хлопоть матери и роднѣ, якъ и коли ему даме ѣсти.

**Перши
часы послѣ
родовъ.**

Рожденіе есть тяжкое дѣло не лишь для матки, але и для дитины, котора сразу попала до иншого свѣта, чимъ была. Все прямое сполученія съ маткою перервано, дитина уже перестала хосновати кислородомъ (необходною частію воздуха), который раньше доставала изъ крови матери и мусить теперь дыхати сама и сама заосматрюватися.

По великомъ утружденю потребуе матка и дитина въ першомъ ряду спокою и сна, которого имъ потребно якъ рыбѣ воды. Дитина засне на довго, бывае что 12—24 годинъ не пробудится. Сесь першій часъ ѣсти не потребуе. Але когда пробудится и кри-

чить, то матка може попробувати приложити ю ко цыцкамъ.

Свята повинность матки есть, абы своєю дитя кормила своимъ молокомъ, абы му на початку житія дала то, что укрѣпитъ еѣ здоровья и дасть грунтъ для всего будущаго житія. Есть доказано, что каждая матка може давати свое молоко дитинѣ, и что лишь во рѣдкихъ случаяхъ на сесе не способна. Дитину не можна отлучити отъ груди безъ важныхъ причинъ и то лишь по наравѣ съ лѣкаремъ.

Во першихъ дняхъ по породу изъ цыцокъ не вытекаетъ молоко, але густе молозиво, свѣтложовте, которое содержитъ каплѣ, часто кусочки жиру. Сеся колостра каждого дня все больше стае похожа на молоко, але ажъ на другій, на пятый, да колы ажъ на осьмый, або десятый день появится истинное молоко. Коли матка дасть во першихъ 24 годинахъ дитинѣ цыцати, то она цыцае мало. Доста буде, если въ сесю пору прикладе дитину до цыцокъ одинъ, ажъ два раза. Дитя выхоснуе 10—20 граммовъ (одну пятьдесятую часть фунта) молока. На другихъ 24 годинъ приложиме его 2—3 разы наибольше 6, схоснуе на 90 граммовъ (одну шестую часть фунта), третій день 190 граммовъ, четвертый 310 граммовъ, пятый 350 граммовъ, шестой 390 и т. далѣ.

Уже на сесѣмъ мѣсцѣ запомняйте собѣ важное дѣло, которое мае цѣну не лишь на першій тыждень, але и на цѣлый дѣточій вѣкъ: Не ушкодиме дитинѣ, когда даеме еѣ їсти лишь столько, сколько потребуе, але можеме сильно поповсати еѣ желудокъ, если ю перегодуеме.

Въ першихъ дняхъ по породу случается, особенно у первѣстокъ, что изъ цыцокъ, або совсѣмъ не вытекаетъ молоко, або лишь мало. Треба на сесе особенно обратити вниманіе всѣхъ матерей и помощницъ при породу, понеже незнаніе сихъ дѣлъ причинило много зла отъ предвременнаго отлученія дитины.

Правда, не можеме чудоватися, когда молода матка-первѣстка повна страху, что изъ цыцокъ не вытекаетъ мо-

**По
винность
матери,
абы сама
дитину
кормила.**

Молозиво.

**Пере-
кормленіе.**

**Недоста-
токъ моло-
ка въ гру-
дяхъ во
першихъ
дняхъ по-
слѣ родовъ
не можетъ
быти при-
чиною от-
лученья
дитины
отъ груди.**

локо и боится за свою дитину. Туй важно, абы ю успокоили, что молоко буде вытѣкати, абы лишь была терпелива и слухала рады. Треба поради, абы не принаглялася со прикормлюванямъ дитины, что може велику шкоду здоровью дитины принести, абы тоже не боялася за дитину, понеже дитя може быти голодное 2 и 3 дни. Если цыцки не дають молока першій день по породу, то свариме слабый, якъ кажутъ, „золотый“ чай, который осолодьме сахариномъ (не цукромъ, 1 таблетку на погаръ чаю) и даиме дитинѣ першого дня разъ ажъ два разъ по 1—2 малѣ ложечцѣ, на другій и третій день 4—6 разъ по обычнѣмъ ложкѣ, потомъ и трохи частѣйше и такъ можеме почекати 4, 5, ажъ 6 днѣвъ.

Другою важною задачою есть сокотѣти цыцки матери. Цыцки мусятъ выпорожняться, абы въ нихъ могло образоватися новое молоко. Прикладаиме дитину, абы выцыцавала молоко. Если цыцае подло, то отдоиме молоко помпочкою, або рукою.

При достаточномъ сокотиню и спокою матки молоко въ большѣмъ числѣ случаѣвъ появится и дитина счастливо буде цыцати, понеже молоко матери не замѣнитъ дитинѣ ничъ на свѣтѣ. И матка буде счастлива, что може своему дитяти дати часть своего существа. Правда, что если молоко не покажется анѣ по 5—6 дняхъ, то конечно треба глядати дойку, або зачати со искусственнымъ кормленіемъ.

Не забывайте, что першое приложеніе дитины до цыцокъ у первородящихъ не удается, понеже не знаютъ кормленія цыцками. Разъ матка не добре дитину держитъ, другій разъ не постерегае, что носикъ дитины не свободный и утопае въ мякотѣ цыцки, не може дыхати и по сей причинѣ пускае цыцку, часомъ матка не правильно цыцку вложить: дастъ вершокъ цыцки далеко въ ротикъ. Сесе може показити кормленіе. (Диви обр. ч. 2 и ч. 3.)

**Подло
вырослѣ
груднѣ
сосочки.**

Еще больше неприятно, если сосочки цыцокъ подло развиты, або западаются до мяса. Тогда дитина не мае за что цыцку ухватити и не може ссати. Да колы можно помогти стекляннѣмъ кlobучкомъ, который наверху мае каучуковое цыцатко и нимъ дитина ссае.

Предполагаеме, что matka мае доста молока и что дитина правильно цыцае. Якъ часто треба прикладати ко цыцкамъ дитину и якъ довго ю лишити цыцать?

Первый тыждень прикладаеме здоровое дитя каждыхъ три години. Въ ноци дитина може и 8 годинъ быти безъ молока. При слабыхъ дѣтяхъ можемо выключно прикладати и скорше: черезъ 2 и повъ години; але сесе есть найкоротша доба и скорѣйше нѣ въ якомъ случаю не прикладайме. Найлѣпше нехай matka припускае дитину до грудей черезъ 3—4 годинѣ, такъ что за 24 годинѣ припуститъ ю пять, шѣсть разъ. Сяке правило matka часто не выповняе и думаетъ, что когда дитина кричитъ, то мае голодъ. Большу часть дитина кричитъ отъ того, что переѣлася, понеже переповненный молокомъ желудокъ причиняе еѣ велику боль: молоко въ желудку и кишкахъ квасится и спричиняе вѣтры, которы воздувають животикъ и дитина ажъ часто корчится отъ болѣ. Переповненя желудка дитины шкодитъ, але довшій отпочинокъ отъ грудей ѣй не шкодитъ.

Здорову дитину такъ довго лишаеме сосати ажъ при томъ спокойно засне. Да которы дѣти цыцають слабо, або съ довгою передышкою и такихъ треба лишати при цыцкахъ ажъ 20 минутъ. Але больше, якъ 20 минутъ лишати нѣтъ смыслу, понеже дитина за ту довшу пору мало выцыцае: еѣ сесе не иде въ хосенъ, а matka ся переутомляе. Можемо видѣти сколько дитина выпье за ту, ци другу добу, если ю передъ цыцаніемъ и по тому выважимо на важкахъ. Разлука межъ вагою спередъ и по цыцаню покаже сколько дитина выпила.

Также можъ высчитати сколько мае дитина выпити матерного молока за 24 години: дѣлиме для сего тѣлесну вагу дитины на 7 и полученне число закруглиме. На примѣръ: если важить дитина 4900 граммовъ. (10 фунтовъ) — тогда потребуе 700 граммовъ молока (фунтъ и повъ).

Передъ тымъ, якъ приложити дитину ко грудямъ, добре трохи молока выпустити, а сосочки (бородавицѣ) легко умыти перевареною, або боровою водою. Очищеніе сосочковъ спиртомъ шкодитъ, понеже они сякъ лишь раздражаются, высыхаютъ, пукаютъ и причиняютъ матери боль. Соски треба держати су-

**Якъ часто
припуска-
ти дитину
ко гру-
дямъ.**

**Якъ довго
дитину ли-
шаеме
сосати?**

**Приготов-
леніе
сосочковъ**

хими и послѣ кормленія приложить на нихъ кусочокъ сухого мягкого полотна, абы капающее молоко впиталось до полотна и не роздражало сосковъ.

**Якъ
сокоутѣти
грудѣ.**

Упомяне туй, что матка мае старатися, абы еѣ груди были пять, або шѣсть разъ порядочно выпорожнены отъ молока. Иншакъ бы не могло образоватися въ нихъ новое

Обр. ч. 2.



Правильне кормленье грудью.

доброе молоко. Люди жъ добрѣ знаютъ, что въмя коровы треба ажъ до послѣдней капли выдоѣти, абы въ ньомъ новое молоко ся образовало. Сякъ треба и матерямъ.

**Отдоува-
нне молока.**

Сесе мусять знати и матерѣ, которы мусять хо- дити на роботу и не можуть во правильну пору свою

дитину до грудей припускати: припускають лишь рано, въ полудне и вечеромъ. Тутъ мусить matka сама молоко изъ своихъ грудей выпускати, або помпочкою, або рукою. Когда прійде часъ цыцанія а matka не може припустити до цыцокъ дитину, то най груди выпорожнить сама. Возьме цыцку рукою потягае трохи

Обр. ч. 3.



Неправильне кормленье грудью.

напередъ и въ долину, легко стискаючи отъ стѣны грудника въ направленію до сосковъ. Движенія подобны, якъ при доенію и матеръ скоро сему призывчается.

Съ порядочнымъ опорожненіемъ грудей сполучено и то, ци мае matka годовати дитину при одномъ припусканью изъ одной цыцки, ци изъ обохъ. Ра-

Кормленье
изъ одной
цыцки.

диме, абы здоровымъ дѣтямъ давали пити при каждомъ кормленію изъ одной цыцки, а при другомъ кормленію изъ другой. Сякимъ способомъ дитина, якъ слѣдуе, „допье“ молоко изъ груди а ровнѣжъ выцыцае послѣднее молоко, котре есть жирнѣйшее. Вопросъ: ци изъ одной цыцки годовати, ци изъ обохъ, мавъ бы рѣшати лѣкаръ.

Подгрудники.

Еще одно замѣчаніе. Не добре, когда жена лишае груди висѣти вдолину. Треба, абы ихъ подвязовала такъ зваными подгрудниками, абы не держалися свободно въ всякомъ положенію.

Чищенъе ротика дитины послѣ ссанья.

Да которѣ матки привыкли вытирати и вымывати по кормленію дѣтямъ губы. И сесе не розумно, понеже легко можна подрапати дитячи уста и занести до нихъ нечистоту.

Коли не можна матерѣ годовати дитину своимъ молокомъ?

Неспособность матери до кормленья дитины своимъ молокомъ.

Лишь тогда, когда не мае молока, або когда бородавицѣ (сосочки) не розвинутѣ, такъ что дитина не може ихъ взяти въ ротикъ, або матка такъ хорообна, что кормлячи могла бы небезпечно заразити и дитину, напр. при сухотахъ (туберкульоза), або тяжкомъ воспаленію нырокъ. Въ такомъ случаю не може рѣшати все матка, анѣ породна баба, але лѣкаръ, по добромъ розмѣркованю! Доба кормленія дѣтей маткамъ не шкодитъ, наоборотъ въ сесю добу они почувають себе найздоровѣйшими и найсчастливѣйшими. Доказано, что переходъ до нормального здоровья послѣ породу у матерей, кормлящихъ грудью своихъ дѣтей, скорѣйшій, якъ у тыхъ, что отдали свою дитину годовати другимъ. Когда лѣкаръ постановить, что матка не може годовати дитину со своихъ груди, то остаеся выбрати одно изъ двохъ, ци отдати дитину кормилицѣ (чужой жонцѣ), ци годовати искусственно.

Кормилица.

Кормилицю можуть собѣ позволить лишь богатѣ люди, понеже она коштуе дуже дорого. Приняти кормилицю и рѣшити ци она есть здорова може лишь лѣкаръ. Кормилица не смѣе быти хора сухотами або сифилисомъ. И сесе може розслѣдовати лишь лѣкаръ.

Способъ житія матери.

Матеръ, кормляща дитину мае такъ їсти, якъ звывкла переже. Она не потребуе отрѣкатися отъ да якої їды, але не повинна їсти дуже острой пищи (оселе-

дець, цибулю и подобныхъ), або пити спиртовѣ напитки (паленка, вино, ликеры). Есть привычка давати кормлящимъ матерямъ больше рѣдкой пищи, запраженноѣ полевки, молока... Много рѣдкой пищи не потребно. Важно, абы матка достаточно ходила на прогулки и вообще абы занималася своимъ обычнымъ трудомъ. Тоже, кто держитъ кормилицу, тотъ мае давати еѣ выковати легки домашнѣ работы.

Коли мало молока вытекае изъ цыцокъ, то не старай-
мезя заосмотрювати матку разными средствами, абы
молока было больше. Нѣ одно средство не поможе.
Лишь порядочное опорожненіе цыцокъ прибавляе
въ нихъ молока.

Кормяща часто матка замѣчае уменьшеніе мо-
лока и тогда вага дитины намъ подтверждаетъ, что ма
не достаточно пищи. Велика ошибка въ такихъ
случаяхъ дитину отлучити и искусственно кормити.
Тогда лѣпше дитину подкормлювати. Каждая капля ма-
теринского молока неоцѣнительна и помогаетъ перева-
реню пищи въ желудку дитины. Але раньше чимъ
подкормлювати, лѣпше постаратися подвижити со-
держаніе молока въ цыцкахъ. При каждомъ прикорм-
люваню впадаеме въ небезпеку, понеже дитину все
таки отъ цыцокъ хоть на коротку добу отлучаеме.
И грудное дитя такое хитрое, что порозумѣе, что для
него легше: ци їда, котора со фляшки сама тече до
роту, ци цыцаніе изъ материнскихъ грудей и може
случитися, что оно захоче лишь фляшку съ молокомъ
и откажется отъ цыцокъ. Матери кажутъ, что дитина
„сама отлучилася“. Абы сего не случилось утруднине
вытокъ молока изъ фляшки, насадивши на ню каучу-
ковый сосочокъ съ малюсенькимъ прорѣзомъ. Если тре-
ба прикормлювати уже во першихъ мѣсяцяхъ, то да-
вайме молоко розрѣдене. По шестомъ мѣсяцю выби-
раеме полевку, або кашку. О томъ поговориме дальше.
Велику цѣну мае прикормлюваня у хоробныхъ се-
мействъ, где матка може дитину годовати изъ своихъ
грудей лишь рано, въ полудне и вечеръ.

Когда матка мае досить молока, то можеме ра-
доватися, если припускае дитину ко грудямъ до 9-ти
мѣсяцевъ. Обычайно, уже на 7 мѣсяць, когда начина-

**Средства
подвысша-
ючи дѣя-
тельность
грудей.**

**Подкорм-
люванье,
або смѣ-
шана їда.**

ють прорѣзоватися, такъ званы, „молочны зубки“, природа сама намъ каже, что можеме дитину отлучити.

**Отлученье
дитины
отъ
грудей.**

Отлучати треба помалу, але не во жарки мѣсяцѣ (юлію, августѣ), не при желудочныхъ хоробахъ дитины, або взагалѣ, когда дитина хора. При отлученю будьме осторожнѣ и не сразу отлучайме. Съ начала нехай дитина привыкае на чужородну їду, але абы мала всягди при случай, когда той їды мало, и молоко матери. Если дитина отлученіемъ захоровала, то припустѣмъ ю зновъ, понеже молоко матки, то — найлѣпшое лѣкарство для дитины. Отлученіе начнеме въ полудне, когда дитина найспокойнѣйша и даме полевку изъ воловины, або телячихъ костей, собравши съ неѣ мастноту. Такъ годуеме тыждень, а потомъ зновъ замѣниме сесю їду матернымъ молокомъ, зновъ на тыждень, потомъ кашку, або питя изъ молока и чередуеме сакъ, ажъ до часу, когда дитина буде совсѣмъ отлучена. Для приготовления каши уживаеме готовыхъ искусственныхъ приправокъ (мука Нестлова, Куфеке, Нутра), або добру, чисту муку, манну крупу, овесъ и т. д.

**Прорѣзанье
зубовъ.**

Во 7 мѣсяцѣ начинаютъ дитинѣ расти зубы. Да коли уже появляются перши зубки во шестомъ мѣсяцѣ, дуже рѣдко дитина уже со зубочками рождается. Перши зубы называеме молочными, ихъ е 20: на горѣ и на долинѣ по 4 рѣзца (переднѣ), по 2 очевыхъ и по 4 корѣнныхъ. Обычно растутъ зубы въ такомъ порядку: 2 внутреннѣ долѣшнѣ рѣзаки, потомъ горѣшнѣ зовнѣшнѣ рѣзаки, потомъ появляются переднѣ корѣннѣ зубы (лицевѣ), долѣшнѣ внутреннѣ рѣзаки, долѣшнѣ переднѣ лицевѣ зубы, потомъ 4 очевыхъ зуба и наконецъ горѣшнѣ и долѣшнѣ заднѣ кореннѣ зубы.

Прорѣзаню зубовъ присужують наши матки и бабки великій впливъ на здоровья дитины и каждую хворобу приписують „отъ зубовъ“. Сесе неправильно, понеже ростъ зубовъ не причиняетъ жадной хвороты.

**Якъ мае
быти
дитина
тяжка?**

Треба поговорити и о томъ, якъ дитина приростае на вазѣ. Памятайме, что увеличеніе ваги еще не значитъ здоровья, треба при правильномъ сякимъ увеличенію позерати и на то, ци тѣло сильне, ци фарба

его здорова и ци дитина проявляе душевну радость и веселость.

Во первыхъ дняхъ послѣ рожденія дитя во вазѣ трохи стратитъ. Така страта чинить одну третю або ажъ повъ фунта. Сесе объясняется тымъ, что дитина въ першихъ дняхъ пріймае мало ѣды (молока) але

Приростокъ ваги въ першомъ роцѣ (Камереръ):

	Вага во грамахъ	
	хлопцы	дѣвчата
При рожденію	3480	3240
Конецъ 4-го тыждня	4170	3810
„ 8 „	5080	4560
„ 12 „	5870	5270
„ 16 „	6580	5900
„ 20 „	7140	6520
„ 24 „	7650	6920
„ 28 „	8140	7380
„ 32 „	8540	7800
„ 36 „	8900	8090
„ 40 „	9220	8400
„ 44 „	9650	8720
„ 48 „	9970	8970
„ 52 „ (1 рокъ)	10210	9660

черезъ дыханіе тратить мочу, калъ и тоже да что тѣлесной текутины. Лишь уже на пятый, на шестой день начинае правильно прибавлятися на вазѣ. Бывае, что да котрый день не стане тяжшимъ, але, если то не повторяется часто, то сесе не важно. Во первой че-

твертѣ рока дитина денно стае тяжша на 26—28 граммовъ, во другомъ на 20—24 грамма, во третьомъ на 16—18 граммовъ, а въ четвертомъ на 10—15 граммовъ денно. Если порохуеме сесе на тыжднѣ, тогда во першой четвертѣ року стае дитина тяжшою на одинъ тыждень почти на повъ фунта (185 граммъ), во другомъ на 154 грамма, въ третьомъ на 119 грам., во четвертомъ на 91 граммъ. Значитъ вага дитины удвоюеся на конецъ пятого мѣсяця (важитъ два разъ столько, якъ при рожденію), во дванацатомъ мѣсяцѣ уже три разъ тяжша, якъ была при рожденію. Розумѣеся, что да коли найдеме числа меньши, а да коли и больши. Дѣти, искусственно кормленѣ (не молокомъ матери) съ початку мало прирастають во вазѣ, але за рокъ ихъ вага выравнивается со вагою дѣтей, натурно кормленныхъ (молокомъ матери).

Припоминаеме, что ошибочно, когда matka радуется, что еѣ дитина товстѣе, жирѣе. Середна вага дитины найлѣпша, если дитина есть радостна и здорова.

II.

Искусственное кормленье. Если matka не може дитя годовати своимъ молокомъ по спомянутымъ раньше причинамъ, то мусиме годовати искусственно. Але можеме сказати, что искусственное кормленіе есть яко лотерія: не знаеме ци выиграеме. При искусственномъ кормленію всягди може настати поруха желудка дитины и таже сяки дѣти тяжко выдержують дѣточи хоробы. Дитя, кормляющееся матернымъ молокомъ легче переносить всяку хвороту, но искусственно годованное дитя отъ той самой хоробы може и умерти, понеже немае пищеварительныхъ органовъ такъ сильныхъ, якъ дитина, годованна молокомъ матери.

И разниця во способностяхъ дѣтей, кормленныхъ материнскимъ молокомъ и дѣтей искусственно годованныхъ замѣчается не лишъ во дѣтствѣ, але и во позднѣйшимъ вѣку.

Коровья-чье и козья-чье молоко. Матерное молоко можна замѣнити, поки вообще можно о замѣнѣ говорити, лишъ молокомъ коровьячимъ, або козячимъ. Якъ молоко коровы, такъ и козы отличаются отъ молока матери и съ той причины нужно

ихъ приспособляти ко сложенію молока матери (особенно розрѣдуюати). Въ большой части случаѣвъ хоснуеме молоко коровы, яко смачнѣйшее и обычное.

Молоко козы уживается меньше про его запахъ, хоть по правдѣ сказати мае да котрѣ лѣпши особенноти, чимъ молоко коровы. Передовсѣмъ козы не нахильны ко сухотамъ (туберколоза), потомъ козу може въ селѣ держати и худобне семейство, еѣ молоко не треба переливати и козу можна май скорше во чистотѣ держати изъ-за еѣ бобковитыхъ выкаловъ.

Тутъ приходиме до дѣла, которое еще остается, ко жалю, нашимъ „наилучшимъ желаніемъ“ ко дѣлу чистыхъ стайнъ и всего, что относится до чистого доѣня. Многимъ покажутся наши желанія дуже великими и непроводными во житіе. Але памятайме, что дѣло дотыкается поживы для тыхъ найменьшихъ, которы мають быти нашою гордостію и организмъ которыхъ, ихъ тѣло, не може боротися такъ легко противъ всѣхъ шкодливинъ, яко тѣло доспѣлого чоловѣка. Съ той причины главне требованье, абы ѣда ихъ была чиста и безъ хоробоплодящихъ зародковъ. Чистота молока зависить отъ чистоты стайнъ, хлѣва, отъ чистоѣ и здоровоѣ марги, чистой дойницѣ, чистой посуды, во которой молоко содержится. Стайня мусить быти высока, свѣтла (велики окна), абы могла быти добре провѣтрювана. Подлога мае быти со склономъ, абы моча (сцяки) могла добре стѣкати. Выкалы маются часто отстраняти, абы маржа въ нихъ не лежала. Мѣсто, где маржа лежить, мае быти поставлено такъ, абы задокъ маржи при лежанію выступавъ ажъ до ярочку, зробленого для выкаловъ и стеканія мочи (сцяковъ). Маржу нужно часто чистити, выганяти на поле и призвычаѣти до погоды такъ, абы и зимою могла ходити по дворѣ а не лише во стайнѣ.

Главнымъ условіемъ есть, абы марга была здорова: для сей цѣли дуже проспѣшно буде, если розслѣдуе лѣкаръ, ци корова не сухотна (туберкулезна). Отъ хорой коровы молоко не можъ пити, понеже еѣ хоробу достати може каждый.

Передъ доѣніемъ нужно чисто умыти вѣмя, та, что доѣтъ, мусить мати чистую одежу, або хоть чи-

**Чистота
стайнъ
и доенья.**

стый фартухъ, чисто умыты руки. Трошки молока треба выстрѣкати на землю, а потомъ до посуды, котора мае быти чиста и гладка, абы нѣгде въ нѣ не задержалася даяка нечистота. Посуду передъ доѣннемъ треба выпарити вареною водою, а по доѣнню накрыты и покласти до переваренія въ холодное мѣсто, абы въ молюцѣ не розвивалися хоробоплодны зародки.

**Приготов-
ление мо-
лока.**

Молоко мае кипѣти пять минутъ, а потомъ треба его уложить въ холодное мѣсто, або хоть до другой посуды стоящей въ холодной водѣ.

**Розрѣд-
ванье мо-
лока.**

Понеже молоко для дитины розрѣжуе, то нужно мати для сего и переварену воду. Дитину годуе пять-шѣсть разъ денно. Лучше молоко разъ розрѣдити и переллѣти его до приготовленныхъ для сего фляшокъ. Передъ тымъ, якъ даеме дитинѣ фляшку розгрѣйме ю. Добре мати столько фляшокъ, сколько разъ будеме дитину годовати. Фляшка мае быти изъ тонкого стѣкла, абы не пукала, мае быти закруглена, безъ острыхъ кутковъ, абы ихъ можно порядочно вымыти. Затвора (пробка) мае быти каучукова, котора при охлажденію сама приляже на горло фляшки и добре ю закрывае. Найлѣпши сосочки на фляшку формы клубочной, або подобнѣ рукавичному пальцу. Дюрочка (отворъ) во сосочкахъ мае быти малюсенька, найлѣпше пропихнута великою иглою. Сосочки треба брати невелики, абы далися добре чистити и, абы дитина, на случай розбыты фляшки, не вдыхнула кусочки стѣкла. Яко всягди и туй треба наибольшей чистоты, понеже брудность при кормленію дѣтей може тяжко помститися. При каждомъ хоснованію фляшку и цыцакъ (сосочокъ) чисто выполощемъ, остатки молока выляеме, цыцакъ и фляшку выпариме и такъ потомъ умѣщаеме, абы на нихъ передъ уживаніемъ не падавъ порохъ. Найлѣпше фляшку вверхъ дномъ покласти на чисту хустилку. Всѣ сесѣ работы матка сама чинить, понеже она найсовѣстнѣйше може сокотѣти все, что относится до здоровья еѣ дитины.

По той причинѣ, что молоко животныхъ содержитъ больше бѣлка и солей, чимъ молоко матери, то молоко ихъ (коровы ци козы) розрѣдиме. Въ першихъ тыждняхъ 1 часть молска розрѣдиме 2 частями пере-

вареной воды, або чаю, во четвертомъ мѣсяцѣ 1 часть молока разрѣдиме 1 частью жидкости; въ 5, 6, 7 мѣсяцяхъ 2 части молока съ одною частью разрѣдьющей жидкости, во 8 мѣсяцѣ самое молоко.

Обр. ч. 4.



Правильне подкормлюванье съ фляшки.

Май лѣпше во першой четвертѣ року разрѣджуе молоко разными отварами (изъ рыжу, манной крупы, овса), а то такъ: въ 1 мѣсяцѣ 1 чайну ложку отвара изъ 5 граммовъ (рыжи, овса и под.) въ 1 литрѣ воды, во 2 мѣсяцѣ — 2-4 чайныхъ ложки изъ отвара 10-20 граммовъ рыжи и под. въ 1 литрѣ воды; во 3 мѣс. 1-2

столовѣ ложки отвару изъ 15-30 грамовъ рижу а под., вареныхъ въ 1 литрѣ воды.

Береме 1 чайну ложку рижу, або крупъ (5 грамовъ), вариме повъ години въ 1 литрѣ воды и перецѣдиме. Отваръ тогда буде добрый, коли при охлажденію не ссѣдается. Во позднѣйшихъ мѣсяцяхъ приготавливаеме отваръ изъ житной, ци рыжовой, або иншакой муки: 1 ложку повну (верхомъ) муки замѣшаеме въ 1 литрѣ воды и вариме четверть години. Потомъ сесь отваръ перецѣжуеме черезъ чистый кусочокъ полотна и перецѣженною жидкостею розрѣджуеме молоко.

Величину порціѣ (одной ѣды) для грудной дитины вычитуеме изъ сякоѣ таблицѣ:

Въ концѣ	Смѣшанина	Сколько разъ на день годовати	Сколько всего грамовъ за 24 годинѣ	Вага одной порціѣ	
				грамовъ	ложекъ
1. тыждня	1 часть молока, 2 части воды	6	350	60	4
1 мѣсяця	" " "	6	600	100	7
2 "	1 часть молока, 1 часть отвара (изъ рижы, изъ крупъ)	5	700	140	9
3 "	" "	5	800	160	11
4 "	" "	5	900	180	12
5 "	2 части молока, 1 часть отвара изъ муки	5	900	180	12
6 "	" "	5	1000	200	13--14

По тому, сколько мѣсячна дитина, приспособляеме для неѣ одну порцію ѣды. На примѣръ: 5 мѣсячной дитинѣ даеме на одну ѣду 6 ложокъ отвару изъ муки на 6 ложокъ воды во множествѣ молока, указаномъ выше. Сакъ розрѣденое молоко осолодиме: до 5 мѣсяцѣвъ одною косткою цукру (або не повну маленьку ложечку), позднѣйше двома костками але бережно, бо цукоръ дитинѣ може вельми ушкодити. Когда переходиме отъ одного розрѣдыванія до другого, то всягди найлѣпше учинити пробу лишь съ одною порціею ѣды, а если дитина проявитъ признаки болѣ въ желудку, то вернемся ко першому способу.

Абы при искусственномъ кормленіи дитины не учинилисьме да якої ошибки, лучше додержовати точно границу межъ однимъ и другимъ кормленіемъ, то есть 3-4 годинѣ. А главное при томъ: найдбалѣйша чистота! Тоже порцію не смѣся давати большу, якъ выше выраховано. Дѣти, кормленѣ искусственно, постоянно находятся на межѣ хворобъ, якъ малѣ ярны квѣточки, пересаженѣ до иншакихъ условій для нихъ не привычного росту.

Отъ седьмого мѣсяця подаеме дитинѣ уже поливку изъ волового мяса, або изъ телячихъ костей, до которой трохи примѣшаеме манной крупы, або даеме рижу, сваренного въ молоцѣ и посолиме. Начинаеме давати 7—8 ложокъ и продовжаеме ажъ до 12. Потомъ вечеромъ молоко не давайме, а вмѣсто него кашу. Послѣ сего уже начинайме давати и разну зеленину, перемятую черезъ сито, крумпльову кашу и под. Съ початку въ полудню послѣ поливки 3—4 ложки, а черезъ нѣсколько днѣвъ на тарѣлочку. Радиме тоже послѣ 8 мѣсяцѣвъ давати дѣтямъ роздушены овощи (безъ косточокъ: черешнѣ, вишнѣ, яблока.

Передъ седьмымъ мѣсяцемъ не вольно дѣтямъ давати розмоченну булку, сухарѣ и подобно, понеже то може повести ко великимъ розстройствамъ организму и завинити кривой ростъ костей, и слабостіе.

Часто матки вопрошуютъ, ци можуть дѣтямъ во першомъ року давати їсти яйцѣ. Дитина въ сесѣмъ возрастѣ може безъ яйца обойтися. По роцѣ можно до поливки прибавити трохи жовтка, а потомъ такъ зрѣдка и цѣлое яйцо, вареное на мягко. Перегодовувати дѣтей яйцами не радиме.

Житіе грудныхъ дѣтей.

Съ початку живе дитина безперемѣнно: спаня и їда сесе — единое занятіе малюсенькихъ. Здорова дитина проспитъ большу часть дня и сама пробуждается въ правильну пору їды. Не прерывайме спаня еѣ, понеже если припознится на повъ години, або на годину до їды, то сесе не шкодитъ.

Выживленіе послѣ седьмого мѣсяця.

Сонъ.

**Дѣти
спокойн
и неспо-
койнѣ.**

Уже межъ сякими малыми созданіями можемо распознати дѣтей спокойныхъ, нормальныхъ и дѣтей нервныхъ, беспокойныхъ. Перши спятъ и ничъ ихъ спаня не перерве: можемо ходити, говорити, можуть други дѣти гратися въ томъ самомъ помѣщенію — они спятъ далѣ. А у другихъ при спанію муситъ чоловікъ ходити

Обр. ч. 5.



Правильне держанье дитины.

„на пальцахъ“, иначе доразъ розбудятся. И не лишъ во спанію розличаются дѣти. Посадьме двоухъ дѣтей одного возрасту около себе и увидиме, что съ однимъ можемо, якъ хочеме гратися и оно лишъ смѣется, а до другого, лишъ доторкнемся, доразъ начинае плакати.

Але нервность дѣтей еще не причиняе ихъ постоянного крику. Дуже часто причиною сего есть пере-

годованя, наслѣдкомъ чего дитина чувствуете боль жалудку и кольки. Все направиме, если точно будеме дитинѣ вымѣрять ѣду.

Натурно, что на подлое спаня дитины матки часто жалуются не лишъ изъ боязни, что дитина собѣ „выкричить пупецъ“, але и изъ той причины, что такимъ цѣлоночнымъ крикомъ дитина приводитъ матку до от-

**Крикъ
дѣтей.**

Обр. ч. 6.



Неправильне держанье дитины.

чаянія. Не чудуймесь, если matka всѣми допустительными и недопустительными средствами старается отстранити сякое зло. То дитину поносить, то погойдаею на рукахъ, то поколыше, то показуе игрушки, (бавульки), звонки и под. Можеме сказати, что колыска есть лѣпшее средство, якъ ношеніе и гойданіе на рукахъ. Matka колысаніемъ не утомляется, дитина може

Колыска.

мати певный, ровный подкладъ подъ собою, который выровное еѣ, всему поддающійся, хребетъ. Одна невыгода сего способу успокоенія дитины — есть привычка: дитина привыкае до колысанія и потомъ сама не засне и крикомъ принуждае, абы ю колысали, або гойдали на рукахъ. (Картина 5 и 6.)

**Ци
шкودить
дитинѣ
крикъ?**

Ци шкودить дитинѣ крикъ? О томъ мѣркують разноматки. Одна каже: „Крикъ ему не зашкودить, буде мати сильнѣ легки (плюцы)“. Друга думае: „Выкричить свой пупецъ“. Истино есть, что много крику дитинѣ шкودить, понеже для неѣ то великій тѣлесный трудъ: да которе дитя кричить ажъ захрипне и все запотѣеся. Анѣ страхъ о томъ, что выкричить собѣ пупецъ, не смѣеме подцѣнювати. Были случаѣ, когда сильнымъ крикомъ дитинѣ трѣснуло у пупця и тоже доставали отъ того дѣти килу. Для того нужно всягды найти причину крику и отстранити ю.

Обманки.

Другимъ вспомогательнымъ средствомъ утихомирения дитины служатъ обманки гумовѣ цыцаки (цумлики), корѣнки и под. Дитина стихне, когда въ ротѣ почувствуетъ обманну цыцку изъ гумы. Але не смѣеме забывати, что при томъ мусится дбати найлѣпшой чистоты, постоянного выварюванія во кипящей водѣ такихъ цыцаковъ и другихъ предметовъ, которы даеме въ ротъ будущому гражданину. Нѣтъ горшого и противного чувства, когда выдиме матку, якъ дае дитинѣ такой обманный, крикъ утѣшающій, предметъ, але передъ тымъ сесъ предметъ послинить. Дитина не може сказати „якъ еѣ то смакуе“, але матка бы мала подумати, якъ бы еѣ было, если бы да кто давъ ей до роту наслиненный предметъ. Тоже шкودливо для здоровья дитины, когда матка посмакуе дитячу ѣду, обслинить ю въ своимъ ротѣ и потомъ вкладаетъ до роту дитины. Сколько дѣтей отъ того достаютъ хворобу! Достаточно, когда матка мае вадный зубъ (въ каждомъ такомъ зубѣ миллионы хворобоплодныхъ зародковъ) и уже дитина хворобу достане. (Образокъ 7, 8 и 9.)

**Кошто-
ванье.**

**Перша
прогулка.**

Якъ при многихъ иншакихъ дѣлахъ и при спаню зоветъ насъ сама природа. Дитина засне скорѣйше и крепше на чистомъ воздуху, чимъ въ закрытомъ, для свѣжого воздуху неприступномъ, помѣщенію. Тутъ при-

ходиме ко новому вопросу: коли съ дитиною можна першій разъ выйти на прогулку? Уже по першомъ тыждню. Правда, выходъме на коротки прогулки и при доброй хвилѣ. Въ зимѣ отвориме окна и прохожуй-месе коло нихъ со закутанною дитиною.

Потомъ не за довго можеме безъ боязни ходити

Обр. ч. 7.



Правильна проба теплоты питья для дитины.

со дитиною на прогулки лѣтомъ, когда нѣтъ великой спраги, а зимою межъ 11 годиною до полудня и 3 год. по полудню. Дитину въ зимѣ добре закутаеме. Бываніе на воздуху продолжайме а если можно будъме со дитиною на свѣжомъ воздуху цѣлый день. Лѣтомъ и для наименьшой дитинѣ можеме благопожелати

наилѣпшого и найздоровѣйшого дару природы — солнечныхъ лучовъ. Съ початку може дитина, одягнена лишь въ сорочку, быти 1—2 минуты на солнцѣ, постепенно бываніе на солнцѣ продовжаеме ажъ до поры,

Обр. ч. 8.



Подлая проба теплоты напою для дитины.

когда сможеме маленького гражданина лишити на солнцѣ голого и колько схоче. При томъ мусиме дитину покласти такъ, абы во жадномъ случаю не дивилася прямо въ солнце, понеже могла бы стратити и зрѣніе.

Воздухъ. Мы еще живеме во часу суевѣрія, забобоновъ.

Видиме, якъ велика часть матерей считае лѣпшимъ оставлять дитину цѣлыми днями во закрытыхъ мѣстахъ безъ доступа свѣжого воздуха и боится лишати дитину середъ здороваго воздуха на дворѣ, ци во саду.

Обр. ч. 9.



Подлая проба теплоты дитячоѣ ѣды.

„Цугъ“ есть страшилищемъ для большинства матерей. А что чинить „цугъ“ (прованъ, сквознякъ, движеніе воздуха)? Якъ може ушкодити дитинѣ движеніе воздуха, котре замѣнное старый, схоснованный плюцами воз-

духъ, новымъ, свѣжимъ? Поглядѣли бы вы до наибольшого дѣтского отдѣленія въ Едличковой санаторіѣ во Празѣ. Тамъ лежать тяжко хорѣ дѣти. Когда туда входите, то не мусите отворяти двери: сихъ тамъ нѣтъ и мусите добре держати свой калапъ, абы его „цугъ“ не отвѣявъ. А дѣти отъ 8 год. вечеромъ, въ маю, лежать голѣ въ постелькахъ прямо на открытыхъ ганкахъ (балконахъ). А что имъ тотъ „цугъ“ помогает, а не шкодитъ, видно изъ того, что сухотну дитину тамъ черезъ мѣсяць дыханія и въ „цугу“ не познаете, якъ поправится и вылѣчится.

Повторяеме, что нѣтъ май лѣпшого спаня и для дитины и для старшого челоуѣка, якъ во здоровомъ, свѣжомъ воздуху, хотъ бы то и бывъ такъ званый „цугъ“.

Укрепленіе
тѣла.

Матки, если любите своихъ дѣтей, воспитуйте ихъ иншакъ, разумно, не говорѣтъ передъ ними нѣколи о простудѣ, о „цугу“ и подобныхъ дѣлахъ. Вспомяньме свою молодость. Сколько пріятныхъ часовъ намъ, якъ дѣтямъ, отруѣли страхи о томъ ци не распаленѣ сьме, ци можеме сѣсти, когда окно отворено, ци не дужемы спотѣлися, ци можеме напиться и такъ далѣ. Оставляйте своихъ дѣтей жити натурнымъ житіемъ, абы хосновали съ даровъ природы, потѣшались солнцемъ, дишомъ и вѣтромъ! Разомъ съ такимъ выхоснованіемъ природы иде укрепленіе тѣла! Каждая мать знае, что мае дитинку каждый день купати. По якой причинѣ перестае купати дитину, когда еѣ минувъ рокъ? Купайте своихъ дѣтей каждый день, укрепляйте ихъ про дальшее житіе! И малу дитину 3охъ мѣсячну можете передъ спанямъ омывати водою лишь трохи теплою (24 града), постепенно уже холоднѣйшою и холоднѣйшою ажъ дойдеме до воды яку держиме обычно въ быванію (16 град.) и увидите, якъ добре буде спати ваша дитина. Трохи старшихъ дѣтей поставиме каждый день до купельки и приготовивши трохи теплой воды и холодной, поливаеме имъ груди и хребетъ, все холоднѣйшою и холоднѣйшою водою; потомъ добре вытриме ихъ и пустѣмъ вонка. Такъ укрепиме ихъ тѣло, что не будутъ страдати воспаленіемъ горла (ангина, жаба), анѣ воспаленіемъ дыхательныхъ цѣвокъ.

Яко прибавкомъ до науки тѣлесного здоровля (гигіена) хочу поговорити о чистотѣ устъ, роту, рукъ и ногтѣвъ. Тутъ мусиме заборонити тому преступному злодѣянню, что дитинѣ вытирають середину рота ряндымъ (тряпкою), обмотаннымъ на палець, понеже тонка слизиста оболочка рота (пеленка) легко поранится и въ ротъ перенесеме разнѣ хоробоплодны бацилы (зародки). Особенно при жабѣ (ангинѣ, воспаленію горла) такое починаніе не розумно. Вельми добре освѣдчуеся чистый кусочокъ полотна, намоченный до боровой воды и поданный дитинѣ, якъ цыцачокъ. Особого чищенія роту дитина не потребуе, нужно лишь старатися, абы все, что даеме еѣ ѣсти было совсѣмъ чистое.

**Чистота
устъ.**

Часто видиме у грудныхъ дѣтей, что мають довги и не чистѣ ногтѣ. Сесе знову завинило суевѣріе, что нѣбыто „ногти до року не можно стригти, понеже бы дитина до року умерла. Ногти мусятся отгризати“. Такъ каже да котора не розумна матерь. Якій грѣхъ! Якъ разъ у грудныхъ дѣтей чистѣ и коротеньки ногтѣ мають велику важность. Мала дитина шкрабається, може пошкрабати собѣ лице, ротъ, губки и нечистота уже дальше спричинить то, что отъ пошкрабанного мѣста по всему тѣлу можуть повстати боляки и прыщи. Дитинѣ вообщемъ можуть прищѣпити всяку хоробу, особенно когда подають еѣ да что нечистыми руками, або цѣлуютъ. Дитину цѣлуе matka, ненько, бабка, дѣдо, тѣтка и т. далѣ. А черезъ цѣлованіе дитина може достати натху, воспаленіе дыхательныхъ трубочокъ и сухоты. Не цѣлуйме и не позволяйме всякому цѣловати дѣтей! А когда уже не можеме уберегтиса того, то не цѣлуйме дитину въ уста, але въ лице, въ чоло и подобно. Кто мае натху, тотъ вообщемъ не мае цѣловати дѣтей, понеже натха дитинѣ може смертельно ушкодити: може спричинити воспаленію уха и легкихъ (плюць). Таки люди нехай во крайномъ случаю стараются на дитину хоть не дыхати и не чихати.

Ногти.

**Чи добре
дитину
позволяти
каждому
цѣловати?**

Можливість хоробной заразы для дитины возросте, когда она начне двигатися. Послѣ шѣсти мѣсяцѣвъ начинае дитина сѣдати, а рочное дитя уже бѣгае. Не прину-
ж-

Бѣганье?

Плюванье.

дайте дитину, абы ходила, почекайте, ажъ сама зачне ставати на ножки. Когда упаде, то не подоймайте ю за ручки, але поподъ плечи. Понеже дитина часто на подлогу (на землю) падае, то нужно, абы подлога была чиста, абы нѣкто на ю не плювавъ. **Отъ злой привычки плюваня въ хатѣ уже много тысячъ дѣтей и людей достало сухотку.** Слина або харки на подложѣ засохнуть, дитина руками до подлоги доторкнется, ручку возьме въ ротъ и уже прищѣпила собѣ хоробу. Не лишъ подлога, але и пѣсокъ, особенно на дѣтскихъ игралищныхъ мѣстахъ и во садкахъ мають быти чистыми.

Бавуль.

Тоже на ляльки (куклы, бавуль), которѣ часто дѣти берутъ до устъ, треба обращати вниманіе. Выбирайте игрушки, которыми дитина не може порѣзаться и которы не потертѣ ядовитыми, пускающими фарбами. Остерегайтесь бавульокъ, которѣ легко дитина може проглотити, до носа, ци до уха собѣ вложить. Не треба дитину обставляти игрушками и ляльками такъ, что ажъ не знае, котору выбрати. Игрушками и ляльками начинается воспитаніе дитины. Лѣпше одну, або двѣ добрыхъ и практичныхъ игрушекъ дати дитинѣ а уже еѣ мышленіе само изъ сякихъ двоухъ сотворитъ въ своимъ умѣ десятки другихъ явленъ. Тоже такъ дитина научается скромности и нѣколи не капризитъ, „не брыкается“.

**Порядокъ
въ ѣдѣ
и спо-
койство.**

Першое воспитательное средство есть порядокъ въ ѣдѣ. Грудное дитя знае, что перемаже крикомъ, але нерозумно, если matka сесь крикъ удовлетворяе. Дѣти отъ першой поры мусять собѣ запамятати и привыкнути, что не они, але мать все рѣшае и мусять еѣ слухати. А сего досягнеме, если точно будеме додержовати пору припусканія дѣтей до цыцокъ и вообще пору ѣды. Во многихъ семействахъ „кормленіе“ дитины доставляе всѣмъ хлопоты. Всѣ тымъ занимаются, особенно, где есть лишъ одно дитя, абы дитину на каждый способъ „ублаготворити“. Разнѣ слуховѣ и свѣтлянѣ игрушки, свистки, гудочки, стукалки и подобно, мигаються дитинѣ передъ очима и ушами и напружують еѣ мозочокъ. И такъ (если дитина хоть трохи нахильна до капризовъ, нервности), окружуючи еѣ лишъ

подкладають грунтъ для розвитія душевнихъ хоробъ. Ненько поскакуе съ одного боку, бабка съ якоюсь свистулькою, або стукалкою съ другою, matka поспѣвуетъ... и при „такой музыцѣ“ мае дитина спокойно ѣсти? Смѣшно! И досягають симъ, якъ разъ противного. Памятайме при їдѣ маеме лишати дитину въ спокою.

Спати дитина мае во такомъ мѣстѣ, абы все видѣла, абы не напудилася, если да что упаде, або зазвонить, ци заскриплять двери.

Во чистотѣ мусить быти выражена вся хлопотпость и любовь до дитины. Ко чистотѣ учиме еѣ привыкати отъ наименьшой поры. Дитина привыкае до чистоты уже концомъ першого року. Когда грудна дитина пробудится, то обычно вымочуется. Хоснуйме изъ сего и въ сесю добу посадьме дитину на горнець. По нѣсколькихъ повтореніяхъ сего намъ удасться приучити дитину проситися „на дворъ“.

Воспитаніе наше да ограничуется на найпростши дѣла яко порядокъ и послушность. Не хочеме мати уже во першомъ року „чудесну дитину“, але благожелайме дитинѣ и помогайме въ томъ, чого найбільше потребуе: въ крепкомъ сну и спокою, якъ для его мозгу такъ и для цѣлого тѣла.

**Чистота
дѣтей.**

Хоробы грудныхъ дѣтей.

Когда въ сосѣдствѣ, або и во семействѣ появит-ся да яка заразительна хвороба, есть першою повин-ностию родичовъ, абы усокотѣли отъ неѣ свою дитину. Стараймесь, что наименьше сполучатися съ особами хворыми, и съ тыми, что около хорыхъ ходять.

**Охорона
передъ за-
разливою
хворотою.**

Когда зараза возникла въ семействѣ дитины, то, если можъ помѣстимъ дитину не въ тѣ хижѣ, где ле-житъ хворый и оставляйме съ нею лишь матку, або особу, котора дитину годует. При томъ матцѣ порадьме, абы помѣщеніе, где находится дитина учинила непри-ступнымъ для другихъ дѣтей (запирала на ключъ).

Когда matka доглядае надъ хворымъ и мусить ве-сти господарство, то нехай тогды, коли иде и находится около хворого, одягне на себе шатя, которе легко мож-

на выпрати (высокій фартухъ, або сукню). Сесю одѣжу matka мае скинути, когда выходитъ отъ хвораго и руки умыти якимсь обезврежующимъ средствомъ (слабымъ ростокѣмъ изъ лизолу, лизоформу, карболки).

Бываніе хвораго треба держати въ наибольшей чистотѣ, особенно подлогу денно омывати (при случаю и обезврежующимъ ростокѣмъ). Все шматя (сорочку, ручки и под.) хвораго треба залишити въ хижѣ, где онъ лежитъ и намочити на 6 годинъ въ обезврежующемъ ростокѣ (лизолъ, одоформъ, одоритъ, трисентолъ и подобныхъ): 4 маленьки ложечки обезврежующаго средства на 1 литръ воды.

Шматя муситъ быти погружено подъ ростокъ, потомъ добре выварено и выпрано во особой посудѣ, камѣнной, ци бляшанной.

Нарядя (ложки, погары, тарѣлки), которѣ хворый уживае, треба позначити (абы други съ нихъ не хосновали), лишити въ хижи хвораго и тамъ полоскати.

Остатки їды послѣ хорого спалити.

**Породна
опухоль
(напухла
голова).**

Доста часто кличуть лѣкаря ко дитинѣ для лѣченія опухшой головы. Тоты породнѣ опухлины видиме найчастѣйше у дѣтей первородныхъ, у которыхъ рожденіе продовжається обычно довго.

Во такихъ случаяхъ дитяча голова довго находится подъ давленіемъ родильныхъ частей матери и по той причинѣ опухае и покрывается да где синяками. Сесѣ опухлины появляются обычно на другій тыждень по рожденію и исчезаютъ по мало самѣ, або послѣ лѣкарской помощи.

Наслѣдкомъ тяжкого рожденія, при которомъ были взятѣ до помощи клещѣ, можуть на тѣлѣ новорожденного появиться опухлины, синяки, раны на головѣ, да коли у очей, лица и рта. Тоже бывае и поруха нервовъ. Але сесе малое попорченія лица скоро само загоїтся.

Важнѣйшимъ и лѣкарской помощи потребующимъ есть то, когда дитина народится со роздвоенною губою, або верхною частію рта. Тяжко дивитися матерѣ на таку дитину. Роздвоенѣ губы называютъ „заячимъ

пискомъ“. Може быти на одной сторонѣ а може и въ горѣшной и въ долѣшной части повздожъ посередной линіи отъ носу до бороды. Розщѣпнуты губы можно сшиты першого року, але розщѣпнутый ротъ, (если онъ не перешкажае при кормленію дитины), лучше оперовати ажъ тогды, когда дитина не дуже плаче, по 2, по 3 рокахъ.

Слѣдующимъ явленіемъ, который причиняе неправильный пробѣгъ породу есть наклонъ головы и шеѣ дитины на одну сторону. Причина сего есть кровотеченіе съ одной стороны головы: когда рана загоѣтся, то связочки мясовы (мышцы) въ томъ мѣстѣ скоротятся и тымъ самымъ голова повернется на одну сторону. Масажомъ, перевязками и такъ зваными галстухами можна во многихъ случаяхъ дѣло направити. Если выгоѣня не удастся, то треба скорочены связки мяса (мышцы) перерѣзати. Розумѣется, что все то може учинити лишь лѣкарь.

Неправильности въ развитію дитины да коли сприняются тымъ, что дитина рождается со затворенымъ ротовымъ отворомъ, а отворы найдеме часомъ на шеѣ. Всягды треба что май скорше прикликати лѣкаря.

Великое вниманіе мусиме звернути на пупецъ. Обычно рана, когда пупковина отпаде, скоро засохне и загоѣтся, але да колы бываютъ и разнѣ пупковѣ хоробы. Рана трохи зачервонѣея, воспалитя, трохи кровавитъ и мокрѣе. Прикладаеме тогды обкладки (примочки) изъ бѣлой воды (квасна), засыпаеме пупецъ чистымъ порошкомъ для присыпки и такъ скоро рану загоѣме. Зле, если рана наче гноѣтися и въ пупковыхъ мѣстахъ наростае живое мясо. Сесе живое мясо може удалити лишь лѣкарь ляписовымъ камѣнцемъ.

**Хоробы
пупка.**

Дѣло пріймае оборотъ важный, когда въ раны заволочена да яка найменша нечистота. Тогда зараза расповсюжуея черезъ кровь по всему тѣлу и може настати отруйность крови, отъ которой дитина умирае. Найглавнѣйша повинность изъ того выплывае, абы со новорожденнымъ заходилися лишь чистыми руками и безъ нужды не доторкалися пупця.

**Напухлѣ
груды.**

Часто у новорожденныхъ замѣчае, что ихъ груды около цыточокъ напухнутъ и при давленіи изъ нихъ вытекае бѣла, брудна сукровица. Сесе опухоль не мае великого значенія, если постараемся не выдушувати той жидкости. Когда выдушемъ, то можеме давленіемъ спричинити воспаленіе грудины, або спричинити хворобу, котору потомъ треба буде лѣчити рѣзаньемъ.

**Жовтянка
новоро-
жденныхъ.**

Почервонѣла, рожова фарба нормального новорожденного бывае часто нажовкла. Называе сесе жовтянкою, котора черезъ мало днѣвъ безъ лѣченія сама статится.

**Запаленіе
горла
(жаба,
ангина).**

Сяка хвороба горла и роту, причинена плѣсенью. Во легкихъ случаяхъ лишь языкъ, въ тяжшихъ и цѣлое горло здаются, яко бы ихъ посыпавъ мукою. (Тому сесею хворобу часто называютъ мучницею.) Слизиста поверхность внутренней полости роту запалена и дитину болить, когда пѣе молоко матери. Сесе хвороба може поступити въ тяжкихъ случаяхъ далеко въ горло и статися даже смертельною у слабыхъ дѣтей.

**Приросшій
язычокъ.**

Вельми часто матка кличе доктора, когда дитина не може цыцати по причинѣ такъ званого „приросшого язычка“. Уздечка, котора связуе языкъ съ доломъ може быти дуже коротка и языкъ мало подвижный. Сему поможе, когда лѣкарь подрѣже уздечку (связку).

Шкура.

Шкура новорожденного дуже нѣжна и послѣ малого роздраженія почервонѣе и можуть на нѣ появи- тися лѣшаѣ и воспаленія. Найзвычайнѣйша подобна хвороба есть „запаренія“ въ области задного проходу (въ роскроку) около половыхъ членовъ. Выпары въ сихъ частяхъ причиняють вогкость и запаленія шкуры. Сесе состояніе есть признакомъ такъ званой діатезы эксудативной, то есть состоянія тѣла, причинен- ного переогодованіемъ молокомъ. Одинъ разъ проявляея сесе состояніе, яко великое „запареніе“, другій разъ лѣшаями, або живымъ огнемъ, болявыми очима, наклонностю до натхи и кашлю. Для того добре если и дитину, на видъ здорову, матка хотъ и рѣдко а все таки покаже докторови и вопроситъ его о способу кормленя. Больша часть матерей думаетъ, что чимъ больше молока дасть за день дитинѣ, то тымъ дитинѣ лѣпше, але межъ тымъ пречасто такое переогодованя, особенно

молочне, дитинѣ дуже шкодить. Лучше послухати лѣкаря и не давати груднымъ дѣточкамъ ѣсти яйцѣ и много молока, але мало, но въ порядку, въ опредѣленны години. Молоко можно замѣнити лишь поливкою.

Всягды переогодованя дитинѣ лишъ шкодить.

Съ того слѣдуе, что не доста ко загоеню выпаринѣ, лѣшаѣвъ, живого огню и под. лишъ присыпаня и при-машованя, але передовсѣмъ правильне и точне кормленіе.

Дѣти часто страдаютъ тымъ, что на волоснѣ частѣ головы образуются у нихъ прыщѣ изъ чистого нагноенія. Прыщѣ остаются на поверхность головы и покрывають часомъ цѣлу голову. Таки дѣти дуже подло визерають и matka кличе на помощь лѣкаря. Прыщѣ треба отмочити олѣмѣмъ и вылущить, але такъ, абы не роздражати нѣжну шкорочку головы. Потомъ головку треба мыти мыловымъ спиртомъ, абы не об-разовывалися новѣ прыщѣ.

Прыщѣ.

Хоробою, котора продовжається у дѣтей довго и причиняе матерямъ много хлопотъ, есть молочна короста, або, якъ кажутъ, живой огонь. Сеся хороба бывае або у переогодованныхъ, ци неправильно годованныхъ дѣтей, або сухошавыхъ, малокровныхъ дѣтей. Появляются уже во четвертомъ мѣсяцѣ житія дитины, яко лѣшаѣ на лицѣ, на бородѣ, вѣчкахъ, чолѣ и головѣ. Начинается почервоненіемъ, твердостью и мокротою шкору, образованіемъ струповъ и прыщовъ. Першимъ условіемъ, абы молочна короста загоѣлася есть, абы дитина не шкрабала струпики. Але якъ сему заборонити? Уговорювати дитину и поучати ю не можеме и ничъ иншакого намъ не остается, якъ завязати еѣ ручки. На ручки даме манжетки изъ твердого паперу, абы не могло ихъ сгинати въ локтяхъ, а на лице маску. Правда тяжко дивитися на такого мученика и matka му часомъ розвязуе руки и сдойме манжетки. Але се велика ошибка, понеже дитина до-разъ ручками начнетъ шкрабати и все наше лѣченіе пропало! Тамъ, где начало гоѣтиса, зновъ появится кровь и дитинѣ стане еще горше. Въ больницахъ строго дбають лѣкарскихъ распоряджень и съ той причины

**Молочна
короста
(живой
огонь).**

тамъ и короста лѣчится легче и скорѣйше. Вообще лѣченіе есть дѣло не матери, але лѣкаря.

Потнички.

Иншаке опрыщеніе дитины, скоропроходящее есть *потнички*. Якъ уже изъ названія видно появляеся у дѣтей, которѣ много потѣются, або которымъ лѣкарь предписавъ такое лѣченіе, что мусять потѣтися. Таке опрыщенія вызначается дробными начервонѣлыми узликами, часто съ бѣлымъ вершкомъ. Сесе опрыщенія не мае значенія и гоѣтся черезъ да колько годинъ по присыпаню порошкомъ для дѣтей.

На концѣ отдѣлу о хоробахъ упомянае еще на пухѣрѣ, на такъ звану фурункулину (чиряки). Да коли бывають лишъ на нѣкоторыхъ частяхъ тѣла (въ огибахъ тѣла и на шеѣ), але и по всему тѣлу розносятся. Сесѣ чиряки наповнены матерією, сукровицею. При скорой лѣкарской poradѣ и при сохраненію повной чистоты сесю хоробу можно вылѣчити скоро.

Чиряки.

Чиряки поодинокі, ци во большомъ множествѣ розсѣянѣ по тѣлѣ, причиняются нечистотою и заразою. Появляются у слабыхъ, або подло кормленныхъ дѣтей, часто у переогодованныхъ и жирныхъ. Если чиряковъ появится много и дитину завчасу не понесуть показати лѣкарови, то она може умерти отъ роскладу и загноенія крови (отравленія крови).

**Англійска
хороба,
кривиця.**

Перейдеме ко хоробѣ найбільше у дѣтей росширенной, т. е. англійской хоробѣ, кривицѣ. Причину сеѣ хоробы еще добре не знаеме. Однѣ кажуть, что она появляеся отъ перекормленія молокомъ и мучною ѣдою, други думаютъ, что недостатокъ внесенія до тѣла вапна причиняе недостатокъ вапна въ костяхъ, слабость ихъ и покривленія. Думаютъ тоже, что велике выпусканія вапна пищеварительными органами причиняе недостатокъ вапна въ костяхъ. Кривиця есть переважно хоробою худобныхъ дѣтей и можеме потвердити, что подлое бываніе, недостатокъ свѣтла и воздуха, нечистота, подла ѣда, бракъ молока матери — сесѣ чинителѣ приготавлиють грунтъ для хоробы, котора цѣлое житіе преслѣдуе дитину.

Першою вѣсткою сеѣ хоробы есть передовсѣмъ много поту, особенно на тѣмю головы! Спочена головка свербитъ, дитина трется о подушку и съ сеѣ

причины часто у такихъ дѣтей находиме малѣ лисыны на головѣ. Дѣти захваченѣ сею хоробою бывають злостнѣ и часто безъ причины кричать.

Кривиця може начатися уже въ першой четверти року. Але появляется наибольше по повѣ року житія. Мать запримѣтитъ, что дитина мае яко „подвойну кость“ (нижня третина кость передъ локтемъ закрубѣе такъ, что здається якъ удвоенна кость). Якъ руки, такъ и ноги бывають опухлого виду и загинаются до формы саблѣ. Ребра тоже грубѣють и дуже выгинаются. Груды узки (птачи груди), брюхо велике, надутое. Голова незакругляеся (нормально голова закрѣпляетъ свои швы уже въ концѣ 16 мѣсяця), горбки на нѣ дуже значительнѣ, а кость въ задѣ головы бывають часто мягки, якъ съ пергаменту (твердого, воскового паперу). Зубы растутъ поздно, неправильно и мають признаки рахитичнѣ (слабоѣ кость, легко крошащойся и покрывляющойся). Хребтова кость загинается, кривится, дитина сгорблюеся и нижня сѣдалищна часть дуже безформенно росте, такъ что у женщинѣ може въ ихъ старши лѣта при породахъ вызвати тяжки наслѣдки. Дѣти захваченѣ сею хоробою бывають дуже блѣднѣ.

Памятайме, что скорою лѣкарскою помощею можна организмъ отъ кривицѣ спасти.

Съ кривицею часто сполучена хороба, котору встрѣчаеме дуже часто. То есть корчи. Дитина стане безъ чувства, очи выкрученѣ, ручки затятѣ, ножки натягнутѣ. Часто дитина зайойкае, крикне и не може дыхати. Не можѣ всѣ причины корчовѣ указати, замѣтиме лишь, что дитячій вѣкъ богатый на корчи разного вида и рѣшити яки то корчи, яка хороба ихъ причиняе може лишь лѣкарь. Разъ причиною корчовѣ може быти высока горячка, другій разъ ѣда, або запорѣ (дитина не може выпорожняти кишки), або достане бѣгавку (черезмѣрно рѣдкой калъ и часто повторяющееся выпорожненія кишокъ), або кривиця, ци заразна да яка хороба, запаленія мозговыхъ пеленокъ и подобно. Сего исчисленія достаточно, абы каждый видѣвъ и повѣривъ, якъ важно есть скоро покликати лѣкаря.

Поговориме еще о двохъ хоробахъ дѣтчого вѣку: о сифилису и туберкулезѣ (сухотцѣ).

Корчи.

Сифилисѣ. Сифилисѣ грудныхъ дѣтей може быти хоробою унаслѣдованною по родичахъ. У родичовъ бывае сея хороба сокрытою, безъ видимыхъ признаковъ. Плодъ такихъ родичовъ часто умре (выкидышъ), дитина передъ дозрѣніемъ народится мертва, ци жива, ци народится въ часть, але признаки хоробы появляются во позднѣйшу пору.

Першимъ признакомъ унаслѣдованноѣ сифилиды бывае постоянна суха натха, затрудняюща дитинѣ цыцати и дыхати. Уже по особомъ сыпливомъ дыханію може лѣкаръ подозрѣвати сифилистичну хоробу (правда, не всяка натха сифилистичного происхожденія!) Скоро появляется плямове опрыщенья, мѣдяноѣ, або гнѣдоѣ фарбы на чолѣ, на бровяхъ, на бородѣ, долонѣ и подошвахъ ноги. Шкура на почервонѣлыхъ мѣстахъ лупится. Дитина мае боляки въ куточкахъ роту, а даколи у заднього проходу находиме яйцовитѣ шкорянѣ выростки, которѣ можуть розпадатися и образовати прыщѣ.

Если дитину не лѣчать, то и костѣ еѣ начнутъ мѣняти свою правильну форму. Тутъ треба доразъ кликати лѣкаря, абы попробовавъ кровь, ци истинно дитина мае сифилистичну хоробу. Сесея проба крови называется Васермановою реакціею. Або для пробы, начинаютъ лѣчити живымъ серебромъ (ртуть) понеже, при сифилисѣ скоро отъ неѣ настае полѣпшеніе.

**Туберку-
льоза
(сухотка).** Туберкульозы во першомъ року житя бывае рѣдко. Але на позднѣйши лѣта уже больше случаѣвъ сеѣ хоробы середѣ дѣтей. Она може быти наслѣдована отъ родичовъ, або призыскана въ дѣточихъ лѣтахъ. По большой части бывае призыскана.

Съ той причины треба наибольше сокотити дѣтей, особенно, въ семействахъ, где нѣкоторый членъ сею хоробою страдавъ. Тяжко въ одной домашности берегти дитину отъ сеѣ хоробы, если кто ю мае. Тяжко для матери. А еще тяжше, если сама мать страдае сею хоробою, або мае еѣ признаки (покашльное, худне и под.). Мусиме старатися, абы дитина наименьше сполучалася съ такимъ хорымъ, абы сесею не цѣловавъ, не дыхавъ на ню, не кашлявъ, абы дитину не утирали ручникомъ хорого. Сяки хворѣ не смѣють харкати и плю-

вати на подлогу, понеже хоробоплоднѣ зародки изъ харковъ и слины потомъ посредствомъ дыханія переходятъ въ груди иншихъ, здоровыхъ людей и гублятъ ихъ легки (плюцы). Сею дорогою росширяется наибольше зараза.

Дитина може быти туберкулезною и тогды, если не кашляе. Туберкулезны бацилы (зародки) розрушають дитячій организмъ и по за легки (плюцы). Часто таки зародки постигнуть и розрушають одинъ осередокъ тѣлесного органу, а потомъ переходятъ въ кровь и спричиняють, або воспаленя мозговыхъ пеленокъ, або нищать все тѣло (туберкулеза всего тѣла).

Въ добромъ случаю постигнута туберкулезными зародками частина внутреннего дѣточного органу повапенѣе и не перешкажае въ дальшомъ житію. Але часто бывае, что таки зародки въ звапенѣлой частѣ пробудятъ другою якоюсь прудкою хоробою и обновлятся къ своему живому, убивающему житію людини.

Сесь образъ (повапенѣлость захоровавшихъ мѣсть) туберкулезы у дѣтей бывае найчастѣйшій, хоть бывають и случаѣ туберкулезы у дѣтей, когда она поражае ихъ легки (плюцы), але сесѣ случаѣ у грудныхъ дѣтей встрѣчаются рѣдко.



Записникъ матери.

День и година нарощденья дитины:

Вага дитины при нарощденью:

Лькаръ:

Баба:

Крещеніе:

Кумъ:

Фарный урядъ:

Фарба волося дитини:

Цвѣтъ очей дитячихъ:

Найльнше похожій:

Перше сидженъе:

Першій зубочокъ:

Первое стояніе на ножкахъ:

Першое хожденъе:

Перше слово:

Примѣтки:

ЖИТІЕ

ПРИРО-

	Всего важить	Сколько прибави- лося		Всего важить	Сколько прибави- лося
На концѣ 1. тыждня			На концѣ 14. тыждня		
2. "			15. "		
3. "			16. "		
4. "			17. "		
5. "			18. "		
6. "			19. "		
7. "			20. "		
8. "			21. "		
9. "			22. "		
10. "			23. "		
11. "			24. "		
12. "			25. "		
13. "			26. "		

ДИТИНЫ.

СТОКЪ ВО ВАЗЪ.

	Всего важить	Сколько прибави- лося		Всего важить	Сколько прибави- лося
На концѣ 27. тыждня			На концѣ 40. тыждня		
28. "			41. "		
29. "			42. "		
30. "			43. "		
31. "			44. "		
32. "			45. "		
33. "			46. "		
34. "			47. "		
35. "			48. "		
36. "			49. "		
37. "			50. "		
38. "			51. "		
39. "			52. "		

ЗАМѢТКИ:

